

*DYTISCIDES ET GYRINIDES RECUELLIS AU VÉNÉZUÉLA ET À LA GUYANE PAR
M. F. GEAY ET FAISANT PARTIE DES COLLECTIONS DU MUSÉUM D'HIS-
TOIRE NATURELLE,*

PAR M. LE D^r MAURICE RÉGIMBART.

Dytiscidae.

DEROVATELLUS LENTUS Wehncke. — Guyane française : Ouanary.

Desmopachria nov. sp. (unique). — Même localité.

ANODONTOCHILUS MACULATUS Bab. — Même localité.

BIDESSUS SURINAMENSIS Rég. — Guyane française : Camopi.

BIDESSONOTUS OBTUSATUS Rég. — Ouanary.

NOTOMICRUS BREVICORNIS Sharp. — Même localité.

Pronoterus ? nov. sp. (unique). — Vénézuéla : Sarare.

SUPHIS CIMICOIDES Aubé. — Ouanary.

Canthydus nov. sp. (unique). — Guyane fr. : Riv. Lunier.

HYDROCANTHUS DEBILIS Shp. — Riv. Lunier, Ouanary, Bas Mahury; Vénézuéla : Sarare.

LACCOPHILUS CAYENNENSIS Aubé. — Guyane française : Het le Père.

Laccophilus flaviventris Rég., nov. sp. — Long. 3 millim. 1/2.

Ovalis, sat elongatus, postice attenuatus, sat convexus; capite et pronoto rufis, hoc post oculos flavo et in medio baseos fusco transversim bimaculato, elytris fusco-castaneis, subnebulosis, fascia postbasali intus obliqua, plus minus disintegrata, macula minuta saepissime gemina extus ad medium, fascia transversali laciniata post medium apiceque rufis, epipleuris flavis; corpore subtus rufo, pedibus antennisque pallide flavis, tarsis posterioribus infuscatis.

Espèce ressemblant beaucoup à *L. suavis* Sharp, du Mexique, mais plus petite et plus étroite de forme, avec les dessins plus réduits et plus dissociés; réticulation analogue, c'est-à-dire double, la grande polyédrique, la petite ronde, toutes les deux peu imprimées; la tête et le pronotum sont jaune roussâtre, la première montrant en arrière deux marques en accolade un peu rembrunies, le second marqué de deux taches transversales brunes le long de la base et d'une tache très vague jaune pâle derrière les yeux, tache qui doit être très apparente chez l'insecte vivant et qui se retrouve chez un certain nombre d'espèces; élytres brun marron plus ou moins foncé, très vaguement nébuleux, ornés des dessins suivants jaune roux : 1° une bande transversale oblique en dedans située en arrière de la base, tantôt presque entière, tantôt divisée plus ou moins en trois taches

géménées, dont l'externe, la plus petite et parfois inconstante, ne touche pas la bordure extérieure à l'épaule, et dont l'interne, la plus grande et la plus constante, est aussi étroitement séparée de la suture; 2° une tache latérale médiane touchant la bordure, tantôt géminée, tantôt confluite; 3° une bande postmédiane transversale touchant la bordure, mais abrégée au tiers externe et formée de cinq petits traits longitudinaux plus ou moins confluent ou séparés; 4° une tache apicale vague et très mal limitée. Dessous du corps d'un roux clair quelquefois un peu rembruni sur l'abdomen; pattes et antennes jaune pâle, tarsi postérieurs ferrugineux. — Guyane : Ouanary et Bas-Carsevenne.

Copelatus nov. sp. (unique). — Le plus petit des *Copelatus*, malheureusement impossible à décrire tant il est immature et incolore : long., 2 millim. $\frac{3}{4}$; testacé, très allongé, sans stries aux élytres. — Ouanary.

Copelatus nov. sp. (unique). — Voisin de *C. longicornis* Shp. — Guyane : Bas Carsevenne.

Copelatus Geayi nov. sp. — Long. 5-5 millim. $\frac{1}{4}$.

Ovalis, elongatus, haud parallelus, parum convexus, rufo-ferrugineus, tenuiter punctulatus, pronoto striolis brevibus extus magis numerosis instructo, elytris fusco-ferrugineis, ad basin anguste dilutioribus, striis undecim in disco tenuibus sed profundis quarum imparibus postice leviter abbreviatis, alteraque submarginali longissima munitis; pedibus antennisque flavis.

Espèce voisine des *C. striatopterus* Aubé et *Brullei* Aubé, mais de couleur différente, ayant comme ses deux congénères la strie submarginale des élytres étendue de la base jusque presque au sommet; les stries du pronotum sont courtes, assez nombreuses, plus imprimées et plus rapprochées vers les angles postérieurs; les onze stries des élytres sont fines mais très imprimées, les impaires un peu plus courtes que les autres, la suturale qui est la plus courte atteignant les trois quarts de la longueur. Tout le corps est roux ferrugineux, les élytres beaucoup plus foncés, très légèrement irisés et plus pâles sur une étroite bordure vague à la base. — Guyane : Ilet le Père. — Trois femelles.

AGLYMBUS LEPRIEURI Aubé. — Guyane : Camopi.

PLATYNECTES DECEMPUNCTATUS Aubé. — Guyane : mont de Kaw.

HYDATIUS SUBFASCIATUS Cast. — Ouanary.

THERMONECTES MARGINEGUTTATUS Aubé. — Mont de Kaw.

MEGADYTES GIGANTEUS Cast. — Guyane : entre le Mana et le Maroni, dans le massif de l'Acarouani.

MEGADYTES COSTALIS Aubé. — Ouanary.

MEGADYTES PUNCTICOLLIS Aubé. — Ouanary,

MEGADYTES LAEVIGATUS Brullé. — Ouanary; entre le Mana et le Maroni.
MEGADYTES STEINHEILI Sharp. — Mana et massif de l'Acarouani.

Gyrinidae.

GYRITES SPECULIGER Rég. — Venezuela : Apure et Rio Nula.

GYRITES SERICEUS Laboulb. — Venezuela : Arauca.

Gyrites Geayi nov. sp. — Long. 4,5-5 millimètres.

Ovalis, parum elongatus, convexus, supra fusco-castaneus, angustissime flavo marginalatus, infra rufo-ferrugineus, pectore utrinque late fusco; prothoracis margine punctato-tomentoso sat angusto, antice latiore; elytrorum margine tomentoso angusto, secundum truncaturam haud latiore et suturam vix ante angulum internum attingente. — ♂ nitidissimus, omnino laevis, tibiis anterioribus sat late triangularibus, tarsis sat late ovatis. — ♀ plus minus late postice reticulata et subopaca, ad basin et scutellum nitidissima.

Très voisin de *G. pygmaeus* Rég., dont il a la taille, la forme et les caractères généraux, il s'en distingue surtout par sa couleur d'un marron foncé à peine irisé sur les élytres, par la bordure tomenteuse un peu moins étroite et par la réticulation de la femelle qui tantôt n'existe qu'au voisinage du sommet, tantôt occupe presque toute l'étendue de l'élytre, moins la base et la région scutello-suturale. — Guyane : rivière Lunier et Haut Carsevenne.

GYRETES PYGMAEUS Rég. — Guyane : montagne de Montsinéry.

GYRETES SCAPHIDIFORMIS Rég., var. — Long. 6-7 millimètres. — Diffère du type par la taille plus grande et un peu plus d'ampleur en arrière de la bordure tomenteuse des élytres. — Vénézuéla septentrional : Anauco, affluent du Guayra.

Hydrophilidae.

STETHOXUS ATER Fab. (*ensifer* Brullé, *ovalis* Brullé, *brasiliensis* Cast.) — Cayenne et massif de l'Acarouani, entre le Mana et le Maroni.

TROPISTERNUS OVALIS Cast. — Mana.

DESCRIPTION DE DEUX PTINIDES ET D'UN NOTOXUS
FAISANT PARTIE DES COLLECTIONS DU MUSÉUM DE PARIS,

PAR M. MAURICE PIC.

PTINUS MULTIMACULATUS nov. sp.

Brevis et latus, nigro piceus, pilis fulvis hirsutus, thorace ad basin et latera-liter elytrisque, 12 maculatis (maculis albidis 4,4,4, oblique dispositis); antennis robustis, nigris; pedibus sat gracilibus, rufescentibus. — Madagascar.